

Concours d'entrée 2002-2003

**Composition de Mathématiques** 

Durée: 3 heures Juillet 2002


**Remarque:** L'usage d'une calculatrice non-programmable est permis. La distribution des notes est sur 25

I- (9 points) Les parties A et B sont indépendantes.

On suppose le plan étant rapporté au repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

- A- On considère la fonction f définie, sur  $]-\infty$ ,  $0[\cup]0,+\infty[$ , par  $f(x)=x-\ln|x|$  et l'on désigne par (C) sa courbe représentative.
  - 1) a- Montrer que  $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ ,  $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$  et  $\lim_{x \to 0} f(x) = +\infty$ 
    - b- En déduire une asymptote à (C)
  - 2) Vérifier que  $f'(x) = \frac{x-1}{x}$ . Dresser un tableau de variation de f.
  - 3) a- Démonter que la droite (d) d'équation y = x est une direction asymptote pour (C) b- Etudier la position relative de (C) et (d)
  - 4) Tracer (d) et (C) dans le même repère.
  - 5) a- Démontrer que l'équation  $x = \ln |x|$  admet une seule racine.
    - b- Soit  $\alpha$  cette racine. Vérifier que -0,568<  $\alpha$  < -0,566. On prend  $\alpha$  =-0,567.
- B-1) On considère l'équation différentielle (E):  $y'' + 2y' + y = -2e^{-x}$ . On pose  $y = ze^{-x}$ 
  - a- Démontrer que z vérifie une équation différentielle (E´). Résoudre (E´)
  - b- Déterminer la solution générale de (E). En déduire la solution particulière de (E) vérifiant : y(0) = -1 et y'(0) = -1
  - 2) On considère la fonction g définie, sur IR, par  $g(x) = -(x+1)^2 e^{-x}$  et l'on désigne par (C') sa courbe représentative.
    - a- Calculer  $\lim_{x\to\infty} g(x)$  et  $\lim_{x\to\infty} g(x)$  En déduire une asymptote à (C´)
    - b-Vérifier que  $g'(x) = (x^2 1) e^{-x}$  et en déduire le tableau de variation de g. Tracer (C´).
    - c- Calculer l'aire du domaine limité par (C'), l'axe des abscisses et les deux droites d'équations x = -1 et x = 1. (On cherchera une primitive G de g de la forme  $G(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$ ).
    - d-Par une lettre graphique, indiquer, suivant les valeurs du réel k, le nombre de solutions de l'équation g(x) = k.
- C- Démontrer que l'équation  $g(x) = \ln |g(x)|$  admet 3 racines dont une seule  $\beta$  est positive. Donner un encadrement de  $\beta$  d'amplitude  $10^{-2}$ .






II- (8 points) Les parties A, B et C de ce problème sont indépendantes

Dans un plan orienté (P), on considère la figure ci-contre formée de deux carrés DABC et OEFD tel que DA = L et DF = l. On désigne par r la rotation de centre D qui transforme A en C,

et par s La similitude directe de centre D, de rapport  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 

et d'angle 
$$+\frac{\pi}{4}$$




A-

- 1) a-Préciser l'angle de r et déterminer r (O).
- b-Déterminer l'angle des deux droites (AO) et (CF).
- 2) a- Déterminer s(B) et s(E).
  - b- Déterminer l'angle  $(\overrightarrow{BE}, \overrightarrow{BF})$ .
- 3) a- Démontrer que le point I d'intersection de (CF) et (BE) est un point du cercle circonscrit au carré ABCD.
  - b- En déduire la nature du triangle AIC.
  - c- Démontrer que les droites (AO), (BE) et (CF) sont concourantes.
- B- On considère la suite de points  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ , ..... $A_i$ ,.....définies par  $A_1 = s(A)$ ,  $A_2 = s(A_1)$ ,

 $A_3 = s(A_2), \dots, A_i = s(A_{i-1}) \dots \text{ On pose } l_1 = AA_1, l_2 = A_1A_2, l_3 = A_2A_3, \dots l_i = A_{i-1}A_i, \dots$ 


- 1) Placer, sur la figure, les points  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  et  $A_4$ .
- 2) Montrer que la suite de terme générale  $l_i$  est une suite géométrique dont on déterminera le premier terme et la raison.
- 3) Calculer  $l_i$  en fonction de L et i.
- 4) Montrer que A<sub>8</sub> appartient à [DA].
- 5) Trouver une relation entre L et l pour que  $A_8$  soit confondu avec F.
- C- On suppose (P) rapporté au repère orthonormé direct  $(O; \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v})$  tel que  $\overrightarrow{u} = -\overrightarrow{OD}$  et  $\overrightarrow{v} = \overrightarrow{OE}$ 
  - 1) Ecrire les formes complexes de la rotation r et de la similitude s
  - 2) On suppose L = 3. On désigne par (γ) le cercle circonscrit au carré OEFD et (γ') le cercle circonscrit au carré DABC.
    - a- Déterminer l'affixe du centre w de l'homothétie positive h qui transforme ( $\gamma$ ) en ( $\gamma$ ').
    - b- Écrire la forme complexe de h.





- III- (3 points) Dans une école il y a trois classes de terminales : la classe T<sub>1</sub> contient 20 élèves dont 8 filles, la classe T<sub>2</sub> contient 30 élèves dont 10 filles et la classe T<sub>3</sub> contient 40 élèves dont 24 filles.
  On choisit <u>au hasard</u> une classe et de cette classe on choisit <u>au hasard</u> un élève pour représenter l'école pendant la fête de fin d'année.
  - 1) Quelle est la probabilité de l'évènement A : « l'élève choisi est une fille de T<sub>3</sub> »?
  - 2) Quelle est la probabilité de l'évènement B : « l'élève choisi est une fille»?
  - 3) On sait que l'élève choisi est une fille. Quelle est la probabilité qu'il soit de T<sub>3</sub>?
- **IV-** (5 points) On suppose l'espace rapporté au repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  et l'on désigne par (P) le plan d'équation 4x-3z+12=0 Soit M(X,Y,0) un point du plan (xOy).
  - 1- Calculer en fonction de X la distance MH du point M au plan (P) et montrer que si MO = MH, alors X et Y doivent vérifier la relation  $9X^2 + 25Y^2 96X 144 = 0$
  - 2- Déduire de cette relation que l'ensemble des points, du plan (xOy), équidistants de O et de (P) est une ellipse (E) dont on déterminera le centre, les foyers et l'excentricité.
  - 3- Le plan (P) coupe (xOy) suivant une droite (d).
    - a- Ecrire un système d'équations paramétriques de (d).
    - b- Montrer que (d) est une directrice de (E).





Concours d'entrée 2002-2003

### Solution de Mathématiques

Durée: 3 heures Juillet 2002

#### I. Partie A

1) a- 
$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} x \left( 1 - \frac{\ln|x|}{x} \right) = +\infty$$
$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty - \infty = -\infty$$
$$\lim_{x \to 0} f(x) = \lim_{x \to 0} -\ln|x| = +\infty$$

b-x = 0 est une asymptote a (C)

2) 
$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$$
, d'où le tableau de variations :

X	$-\infty$	0	1 +∞
f'(x)	+	_	0 +
f(x)	+ 0	$0 + \infty$	$+\infty$
	<b>*</b>		A
	$-\infty$		1

3) a- 
$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to +\infty} \left( 1 - \frac{\ln|x|}{x} \right) = 1$$


$$\lim_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to -\infty} \left( 1 - \frac{\ln|x|}{x} \right) = 1$$

$$\lim_{x \to +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \to +\infty} (-\ln|x|) = -\infty$$

$$\lim_{x \to -\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \to -\infty} (-\ln|x|) = -\infty$$

Donc la droite d'équation y = x est une direction asymptotique de (C) en  $+\infty$  et en  $-\infty$ 






b- On a  $f(x) - x = -\ln|x|$  d'où les 3 cas :

- (C) est au-dessus de (d) pour |x| < 1 donc pour -1 < x < 1 avec  $x \ne 0$ .
- (C) est au-dessous de (d) pour x > 1 ou x < -1.

Donc (d) coupe (C) aux points (1;1) et (-1; -1).

4)



5) a- L'équation  $x = \ln|x|$  est équivalente a  $x = \ln|x| = 0$  et a f(x) = 0, donc il s'agit d'étudier l'intersection entre (C) et l'axe x' x.

Graphiquement on voit que (C) coupe x' x en un seul point d'abscisse négative.

b- On a: 
$$f(-0.568) = -0.002 < 0$$
 et  $f(-0.566) = 0.0031 > 0$ 


Donc  $-0.568 < \alpha < -0.566$ . Soit  $\alpha = -0.567$ 

B-1) a- On a : 
$$y' = e^{-x} (z' - z)$$
 et  $y'' = e^{-x} (z'' - 2z' + z)$ 

En remplaçant y' et y'' dans (E) on obtient z'' = -2 (E').

Ce qui donne z' = -2x + a et  $z = -x^2 + ax + b$ 





b- La solution générale de (E) est  $y = (-x^2 + a x + b) e^{-x}$ 

$$y(0) = -1$$
 donne  $b = -1$ .

On a  $y' = e^{-x} (-2x + a + x^2 - a x - b)$ , y'(0) = -1 donne a - b = -1 d'ou a = -2 et par suite la solution particulière de (E) est :  $y = (-x^2 - 2x - 1) e^{-x} = -(x+1)^2 e^{-x}$ .

2) a- 
$$\lim_{x \to -\infty} g(x) = \lim_{x \to -\infty} [-(x+1)^2 e^{-x}] = -\infty$$


$$\lim_{x \to +\infty} g(x) = \lim_{x \to +\infty} \left[ \frac{-(x+1)^2}{e^x} \right] = 0$$

Donc l'axe x'x est une asymptote à (C').


$$\lim_{x \to -\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \to -\infty} [-(x+1)^2 \frac{e^{-x}}{x}] = +\infty$$

Donc y'y est une direction asymptotique pour (C') en  $+\infty$ .






b-  $g'(x) = -2(x+1) e^{-x} + e^{-x}(x+1)^2 = (x^2-1) e^{-x}$ , d'où le tableau de variations :



$$-\frac{4}{e} \approx -1,471.$$




c-  $A = -\int_{-1}^{1} g(x)dx$ , si  $G(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$  est une primitive de g on aura

$$G'(x) = g(x)$$
, ce qui donne  $-ax^2 - (b-2a)x - (-b+c) = -x^2 - 2x - 1$ ,

soit 
$$a = 1$$
;  $b = 4$ ;  $c = 5$  et par suite  $G(x) = (x^2 + 4x + 5)$  e<sup>-x</sup>

D'où 
$$A = -[G(x)]_{-1}^{1} = G(-1) - G(1) = 2e - \frac{10}{e}u^{2}$$





d- Soit (d) la droite d'équation y = k, parallèle à x'x

Si k <  $-\frac{4}{e}$  alors (d) coupe (C) en un seul point, donc l'équation a une seule solution.

Si  $k = -\frac{4}{e}$ , il y a deux racines dont l'une est double x = 1


Si  $-\frac{4}{e} < k < 0$  il y a trois solutions.

Si k = 0, il y a une solution double x = -1

Si k > 0, pas de solutions.

C- L'équation  $x = \ln|x|$  admet une seule solution négative  $\alpha = -0.567$  donc  $g(x) = \ln|x|$  admet des solution pour g(x) = -0.567 Or -1 < -0.567 < 0 donc il y a trois valeurs de x dont l'une seule est positive ;  $\beta > I$ . Et puisque g(3.63) = -0.568 et g(3.64) = -0.565, on déduit que  $3.63 < \beta < 3.64$ .

II-




A- 1) a- On a  $((\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}) = \frac{\pi}{2}(2\pi)$  et  $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{DC}$  donc r est une rotation de centre D et

d'angle 
$$\frac{\pi}{2}$$
,  $r = r\left(D, \frac{\pi}{2}\right)$ .

$$r(O) = F$$
, car  $DO = DF$  et  $(\overrightarrow{DO}, \overrightarrow{DF}) = \frac{\pi}{2}(2\pi)$ .

b- On a r(A) = C et r(O) = F d'où  $(\overrightarrow{AO}, \overrightarrow{CF}) = \frac{\pi}{2}(2\pi)$  Donc les deux droites (AO) et (CF) sont perpendiculaires.





2) a- On a 
$$\int DC = \frac{\sqrt{2}}{2}DB$$
 et 
$$\int DF = \frac{\sqrt{2}}{2}DE$$
 
$$(\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC}) = \frac{\pi}{4} \pmod{2\pi}$$
 
$$(\overrightarrow{DE}, \overrightarrow{DF}) = \frac{\pi}{4} (2\pi)$$

$$\begin{cases}
DF = \frac{\sqrt{2}}{2}DE \\
(\overrightarrow{DE}, \overrightarrow{DF}) = \frac{\pi}{4}(2\pi)
\end{cases}$$

Donc s(B) = C et s(E) = F

b- On a 
$$s(B) = C$$
 et  $s(E) = F$ , d'ou  $(\overrightarrow{BE}, \overrightarrow{CF}) = \frac{\pi}{4}(2\pi)$ 

- 3) a- On a  $(\overrightarrow{IB}, \overrightarrow{IC}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{4}(2\pi)$  donc les points *I*, *A*, *B* et *C* sont cocycliques et par suite I est un point du cercle circonscrit au carré ABCD
  - b-[AC] est un diamètre du cercle circonscrit au carré ABCD donc  $\overrightarrow{AIC} = 90^{\circ}$  et par suite le triangle AIC est rectangle en I.
  - c- (AI) est perpendiculaire à (CF) et (AO) est perpendiculaire à (CF) donc A, I, O sont alignés, par suite (AO), (BE) et (CF) sont concourantes en I.
- B- 1) a- On a  $A_1 = s(A)$ , donc  $A_1$  est le milieu de [BD]

 $A_2 = s(A_1)$ , donc le triangle  $DA_1A_2$  est rectangle isocèle et  $A_2 \in (CD)$ ;  $A_2$  est le milieu de [CD].

 $A_3 = s(A_2)$ , donc le triangle  $DA_2A_3$  est rectangle isocèle et  $A_3 \in (DE)$ .

 $A_4 = s(A_3)$ , donc le triangle  $\overline{DA_3A_4}$  est rectangle isocèle et  $A_4 \in (DA)$ ;

2) 
$$\ell_i = A_{i-1}A_i$$
,  $donc \ \ell_i = AA_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}DA = \frac{\sqrt{2}}{2}L$ 

Le triangle  $DA_{i-1}A_i$  est rectangle isocèle en  $A_i$ , d'où :


$$\ell_i = \frac{\sqrt{2}}{2} DA_{i-1} = \frac{\sqrt{2}}{2} A_{i-2} A_{i-1} = \frac{\sqrt{2}}{2} \ell_{i-1} \text{ donc } (\ell_i) \text{ est une suite géométrique de } 1^{\text{er}} \text{ terme}$$

$$\ell_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} L \text{ et de raison } \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

3) On a 
$$\ell_i = \ell_1 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{i-1} = \frac{\sqrt{2}}{2} L \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{i-1} = L \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{i}$$

4) On a 
$$(\vec{DA}, \vec{DA_8}) = 8 \times \frac{\pi}{4} (2\pi) = 0(2\pi) \text{ et } DA_8 < L. \text{ Donc } A_8 \in [DA].$$





5) 
$$A_8 = F$$
 donne  $A_7 A_8 = \ell_8 = DA_8 = DF$  D'où:  $\ell = \ell_8 = L \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^8 soit \ \ell = \frac{L}{16}$ 

C -1) On a D (-1; 0), la forme complexe de r est :

$$r: z \to Z = az + b$$
, avec  $a = i$  et  $-1 = \frac{b}{1-i}$ ;  $b = -1 + i$  D'où  $Z = iz + i - 1$ .

La forme complexe de s est : s:  $z \rightarrow Z = az + b$  avec :  $a = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{i\frac{\pi}{4}} = \frac{1+i}{2}$  et

$$-1 = \frac{b}{1 - \frac{1}{2} - \frac{i}{2}} \text{ soit } b = \frac{i}{2} - \frac{1}{2} \text{ d'ou } Z = \left(\frac{1+i}{2}\right)z - \frac{1}{2}(1-i)$$


2) a- Le rapport de l'homothétie est k = 3, 1 centre de  $(\gamma)$  est  $I\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$  et le centre de  $(\gamma')$  est

$$I'\left(-\frac{5}{2},\frac{3}{2}\right)$$
 On a  $h(I) = I'$  d'où  $\overrightarrow{WI'} = 3\overrightarrow{WI}$  donc  $z_r - z_w = 3z_1 - 3z_w$  ce qui donne

$$2z_w = 3z_1 - 3z_r = 1$$
, soit  $z_w = \frac{1}{2}$ 

b- la forme complexe de h est : h:  $z \to Z = kz + b$  avec k = 3 et  $\frac{1}{2} = \frac{b}{1-3}$  d'où b = -1Par suite Z = 3z - 1.


III- 1) On a  $p(A) = p(F \cap T_3) = p(T_3) \cdot p(F/T_3) = \frac{1}{3} \times \frac{24}{40} = \frac{1}{5}$ 



$$p(B) = p(F) = p(F \cap T_1) + p(F \cap T_2) + p(F \cap T_3)$$

2) On a 
$$= \frac{1}{3} \times \frac{8}{20} + \frac{1}{3} \times \frac{10}{30} + \frac{1}{3} \times \frac{24}{40} = \frac{4}{9}$$





3) On a 
$$p(T_3/F) = \frac{p(T_3 \cap F)}{p(F)} = \frac{p(A)}{p(B)} = \frac{9}{20}$$

**IV-** 1) On a 
$$MH = \frac{|4x+12|}{\sqrt{16+9}} = \frac{4}{5}|x+3|$$
.

MO =MH donne 
$$\overline{MO}^2 = \overline{MH}^2$$
 d'où:  $x^2 + y^2 = \frac{16}{25}(x^2 + 9 + 6x) = 0$  ou  $9x^2 + 25y^2 - 96x - 144 = 0$ 

2) L'ensemble des points du plan (xOy) équidistants de O et de (P) est la courbe d'équation

$$9x^2 + 25y^2 - 96x - 144 = 0$$
 qui est équivalente à :  $\frac{\left(x - \frac{16}{3}\right)^2}{\frac{400}{9}} + \frac{y^2}{16} = 1$ 

C'est une ellipse de centre  $w(\frac{16}{3},0)$  et d'axe focal x'x.

Or 
$$c^2 = a^2 - b^2 = \frac{400}{9} - 16 = \frac{256}{9}$$
 d'ou  $c = \frac{16}{3}$ .

Les foyers sont : 
$$F(\frac{16}{3} + \frac{16}{3}, 0) = F(\frac{32}{3}, 0)$$
 et  $F'(\frac{16}{3} - \frac{16}{3}, 0) = F'(0, 0)$  et  $e = \frac{c}{a} = \frac{\frac{16}{3}}{\frac{20}{3}} = \frac{4}{5}$ 

3) (d) est l'intersection de (P) et de (xOy), d'où : (d) 
$$\begin{cases} 4x - 3z + 12 = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

a-Un système d'équations paramétriques de (d) est 
$$\begin{cases} x = -3 \\ y = m \end{cases}$$

b- L'un des foyers est O, on a

$$MO = MH = \frac{4}{5}|x+3|$$
 et  $d(M;(d)) = |x+3|$ , d'ou  $\frac{MO}{d(M,(d))} = \frac{\frac{4}{5}|x+3|}{|x+3|} = \frac{4}{5} = e$ 

Donc (d) est une directrice de (E) associée au foyer O.